



Quận Sedgwick...
làm việc cho bạn

Phòng Y Tế

SÖIKIEÄN & chi tiết

thuốc về Chính Quyền của Hải Sedgwick

Vắc xin Xịt Mũi Phòng Bệnh Cúm (FluMist®)

8 Tháng Mười, 2009

FluMist® là gì?

FluMist® là một loại thuốc dạng sương xịt mũi, được xịt vào từng bên lỗ mũi. Thuốc giúp cơ thể phát triển các kháng thể, giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh cúm.

Ai có thể sử dụng FluMist®?

FluMist® đã được phê duyệt dùng cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn khỏe mạnh từ 2 đến 49 tuổi.

Ai không nên sử dụng FluMist®?

Có một số người không nên sử dụng FluMist®:

- Trẻ dưới 2 tuổi
- Những người từ 50 tuổi trở lên
- Những người mắc bệnh mạn làm suy yếu hệ miễn dịch của họ hoặc khiến cho họ gặp nguy cơ biến chứng cao từ bệnh cúm (như bệnh tim; hen suyễn; tiểu đường hoặc suy thận)
- Những người dùng thuốc mà có thể làm suy yếu hệ miễn dịch
- Trẻ em dưới 5 tuổi có lịch sử bị thở khò khè tái phát
- Trẻ em hoặc thanh thiếu niên đang điều trị bằng thuốc aspirin
- Những người có lịch sử mắc hội chứng Guillain-Barré
- Phụ nữ có thai
- Những người bị dị ứng nặng với trứng gà hoặc dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vắc xin xịt mũi

Các tác dụng phụ thường gặp nhất là gì?

Ở trẻ em, các tác dụng phụ bao gồm chảy nước mũi, nhức đầu, thở khò khè, nôn, đau cơ và sốt. Ở người lớn, các tác dụng phụ có thể bao gồm chảy nước mũi, nhức đầu, đau họng và ho.

Tôi có thể bị cúm từ vắc xin FluMist® không?

FluMist® đã được phát triển theo cách thức không thể gây ra bệnh cúm. Không giống như tiêm phòng cúm, vắc xin xịt mũi chứa virus còn sống; tuy nhiên, các virus đã bị làm yếu và không thể gây ra bệnh cúm. Các virus bị làm yếu được chuyển biến thích nghi với nhiệt độ lạnh, có nghĩa là chúng không thể lây nhiễm cho phổi và các vùng khác có nhiệt độ ấm hơn.

Những người tiếp xúc với những người có hệ miễn dịch bị suy yếu có thể sử dụng FluMist® không?

Những người tiếp xúc với những người khác có hệ miễn dịch bị suy yếu nặng khi họ được chăm sóc trong môi trường bảo vệ (ví dụ những người ghép máu cuống rốn), không nên sử dụng FluMist®. Những người tiếp xúc với những người khác có mức độ ức chế miễn dịch nhẹ hơn (ví dụ những người bị tiểu đường, hen suyễn đang dùng corticosteroids, hoặc HIV) có thể sử dụng FluMist®. Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình và những người khác tiếp xúc gần gũi với phụ nữ có thai có thể sử dụng vắc xin xịt mũi.

Những người dùng FluMist® có thể truyền virus của vắc xin cho người khác không?

Trong các nghiên cứu lâm sàng, việc truyền nhiễm virus của vắc xin sang những người tiếp xúc gần gũi ít khi xảy ra. Nguy cơ ước tính của việc bị nhiễm sau khi tiếp xúc gần gũi với người dùng vắc xin xịt mũi rất thấp (0,6%-2,4%). Vì các virus bị làm yếu, việc nhiễm hầu như không thể dẫn đến các triệu chứng bệnh cúm vì vẫn chưa có trường hợp nào cho thấy các virus của vắc xin biến đổi (thay đổi) thành virus cúm điển hình.



Quận Sedgwick...
làm việc cho bạn

Phòng Y Tế

SÖIKIEÄN & chi tiết

thuộc về Chính Quyền của Hạt Sedgwick

Vắc xin Xịt Mũi Phòng Bệnh Cúm (FluMist®) -Tiếp theo

8 Tháng Mười, 2009

Có thể sử dụng FluMist® cho bệnh nhân đang ốm được không?

Có thể sử dụng FluMist® cho bệnh nhân mắc bệnh nhẹ (như tiêu chảy hoặc nhiễm khuẩn đường hô hấp trên mức độ nhẹ có sốt hoặc không). Tuy nhiên, nếu người này bị nghẹt mũi mà có thể làm hạn chế khả năng tiếp cận thành mũi của vắc xin, người này nên đợi cho đến khi giảm bớt sự nghẹt mũi.

Có thể sử dụng FluMist® cùng lúc với các loại vắc xin khác không?

Có thể sử dụng vắc xin dạng tiêm (không được kích hoạt) cùng lúc hoặc bất kỳ lúc nào trước hoặc sau khi sử dụng vắc xin xịt mũi phòng bệnh cúm. Không thể sử dụng thuốc xịt mũi phòng bệnh cúm H1N1 cùng lúc với thuốc xịt mũi dành cho bệnh cúm theo mùa.

Có thể sử dụng FluMist® cùng với các loại thuốc kháng virus trị bệnh cúm không?

Nếu một người đang uống thuốc kháng virus trị cúm (kể cả Symmetrel [kháng virus] trị bệnh Parkinson), người này không nên sử dụng vắc xin xịt mũi phòng bệnh cúm trong vòng 48 giờ sau khi sử dụng liều thuốc kháng virus cuối cùng. Nếu một người đã sử dụng vắc xin xịt mũi phòng bệnh cúm, người này không được sử dụng thuốc kháng virus trị cúm trong vòng 2 tuần sau khi sử dụng vắc xin xịt mũi phòng bệnh cúm.

Có an toàn không khi cho con bú sau khi sử dụng FluMist®?

Có. Vắc xin FluMist® không ảnh hưởng đến sự an toàn của người mẹ đang cho con bú và con của họ.

Có an toàn không đối với nhân viên y tế đang mang thai quản lý thuốc FluMist®?

Có. Không cần thiết phải có các phòng ngừa đặc biệt (như găng tay). Phải rửa tay hoặc vệ sinh tay bằng thuốc sát trùng không sử dụng nước trước và sau khi quản lý vắc xin hoặc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trong môi trường chăm sóc sức khỏe.

Làm thế nào để biết thêm thông tin?

Để biết thêm thông tin về H1N1, vui lòng gọi cho Phòng Y Tế của Hạt Sedgwick theo số 660-5558 hoặc gửi email cho flu@sedgwick.gov.